

Universidade Federal do Ceará
Departamento de Computação

Matemática Discreta
Lista de exercícios 3

Cada $\sqrt{\quad}$ denota um nível de dificuldade: $\sqrt{\quad}$ fácil, $\sqrt{\sqrt{\quad}}$ médio e $\sqrt{\sqrt{\sqrt{\quad}}}$ difícil.

$\sqrt{\sqrt{\quad}}$ 1. (**recorrências**) Resolva as seguintes recorrências:

- (a) $a_n = a_{n-1} + 7, \quad a_0 = 13;$
- (b) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} + 3, \quad a_0 = 8;$
- (c) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} - 6 \cdot a_{n-2}, \quad a_0 = 2, a_1 = 5;$
- (d) $a_n = 4 \cdot a_{n-1} - 4 \cdot a_{n-2}, \quad a_0 = 1, a_1 = 3;$
- (e) $a_n = 5 \cdot a_{n-1} - 6 \cdot a_{n-2} + 6, \quad a_0 = 5, a_1 = 8;$

$\sqrt{\sqrt{\quad}}$ 2. (**recorrências**) Seja $n = 3^k$, para algum $k \in \mathbb{N}$. Resolva a seguinte relação de recorrência: $T(n) = T(n/3) + 17, T(1) = 29$.

$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\quad}}}$ 3. (**recorrências**) Assumindo que n é uma potência de 2, resolva a seguinte relação de recorrência e depois prove a corretude por indução:

$$\begin{aligned} T(n) &= 6 \cdot T(n/2) - 8 \cdot T(n/4), \quad \text{se } n > 2 \\ T(1) &= 2 \\ T(2) &= 6 \end{aligned}$$

(**Dica:** é possível obter uma recorrência de 2º ordem para nos ajudar. Para isso, substitua n por 2^k na recorrência)

$\sqrt{\quad}$ 4. (**inclusão e exclusão**) Em um grupo de 155 alunos, 84 possuem computador pessoal, 100 possuem endereço eletrônico, 30 possuem página pessoal, 54 têm computador pessoal e endereço eletrônico, 15 têm computador e página pessoais, 8 possuem endereço eletrônico e página pessoal, e 3 alunos têm computador pessoal, endereço eletrônico e página pessoal. Responda as seguintes perguntas usando o Princípio da Inclusão e Exclusão:

- (a) Quantos alunos têm apenas endereço eletrônico?
- (b) Quantos alunos não possuem nenhum dos 3 itens?
- (c) Quantos alunos têm computador e homepage, mas não tem email?

$\sqrt{\sqrt{\quad}}$ 5. (**inclusão/exclusão**) Quantos inteiros de 1 a 100.000 não são divisíveis por 2, 3, 5, 7, 11 ou 13?

$\sqrt{\sqrt{\quad}}$ 6. (**casa dos pombos**) Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $A \subseteq \{0, 1, \dots, 2n - 1\}$. Mostre que se $|A| = n + 2$, então existem $a \in A$ e $a' \in A, a \neq a'$, tais que $a + a' = 2n$.

$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\quad}}}$ 7. (**casa dos pombos**) Sejam $n \in \mathbb{N}, n > 1$, e $A \subseteq \mathbb{N}$. Prove cada uma das afirmações a seguir.

- (a) se $|A| = n + 1$, então existem $a \in A$ e $a' \in A, a \neq a'$, tais que $a - a'$ é divisível por n .
- (b) se $|A| = n + 2$, então existem $a \in A$ e $a' \in A, a \neq a'$, tais que $(a - a'$ é divisível por $2n)$ ou $(a + a'$ é divisível por $2n)$.

Observe que $a - a'$ é divisível por n se e somente se $a \bmod n = a' \bmod n$, e que $a + a'$ é divisível por n se e somente se $(a \bmod n) + (a' \bmod n) = n$.

√√ 8. (**casa dos pombos**) Mostre que, em todo grupo de $n \geq 2$ pessoas, há duas pessoas com o mesmo número de amigos no grupo. Considere que a relação “ser amigo” é simétrica mas não é reflexiva.

√ 9. (**permutações**) Se enumerarmos todas as permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 em ordem crescente, então:

- (a) que posição ocupa o número 42513? (b) qual número ocupa a posição 73?

√ 10. (**combinações**) Quantos são os subconjuntos de k elementos de $\{1, 2, \dots, n\}$ nos quais:

- (a) 1 aparece? (b) 1 não aparece? (c) 1 e 2 aparecem?

√√ 11. (**combinatória**) Considere todos os subconjuntos com 5 elementos de $\{1, 2, \dots, 12\}$. Se ordenarmos todos esses subconjuntos por ordem crescente de índices, em quantos subconjuntos o elemento 8 aparece na posição 3 da sua ordenação?

√√ 12. (**combinatória**) Quantas são as soluções de:

- (a) $w + x + y + z = 50$, sendo w, x, y e z números naturais?
 (b) $w + x + y + z = 120$, sendo w, x, y e z números naturais tais que pelo menos um deles é maior que 27?

√√√ 13. (**combinatória**) Demonstre as seguintes afirmações:

- (a) $\binom{n+p+1}{p} = \sum_{r=0}^p \binom{n+r}{r}$. **Dica:** Stifel e indução em p .
 (b) $\binom{n+p+1}{p+1} = \sum_{r=0}^n \binom{p+r}{p}$ **Dica:** Stifel e indução em n .
 (c) $\binom{n+2}{p+2} = \binom{n}{p} + 2\binom{n}{p+1} + \binom{n}{p+2}$. **Dica:** Stifel duas vezes.
 (d) $\binom{n+3}{p+3} = \binom{n}{p} + 3\binom{n}{p+1} + 3\binom{n}{p+2} + \binom{n}{p+3}$. **Dica:** Stifel três vezes.
 (e) $\binom{n+4}{p+4} = \binom{n}{p} + 4\binom{n}{p+1} + 6\binom{n}{p+2} + 4\binom{n}{p+3} + \binom{n}{p+4}$. **Dica:** Stifel quatro vezes.
 (f) $\binom{n+k}{p+k} = \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} \cdot \binom{n}{p+r}$. **Dica:** Stifel k vezes ou indução em k .

√√ 14. (**combinatória**) Determine o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{99} \quad \text{e de} \quad \left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{100}$$