

Teoria dos Grafos
Lista de exercícios 3

O número de asteriscos em uma questão indica a sua dificuldade.

Observação: n , m , $c(G)$, $\Delta(G)$ e $\delta(G)$ denotam respectivamente o número de vértices, o número de arestas, o número de componentes, o grau máximo e o grau mínimo de um grafo denotado por G .

1. Prove ou mostre um contra-exemplo, onde $c(G)$ é o número de componentes de G .
 - (a) Todo grafo conexo possui pelo menos $m - n + 1$ ciclos distintos.
 - (b) Uma floresta G possui $n - c(G)$ arestas.
 - (c) Um grafo G com $m = n$ é um ciclo.
 - (d) Um grafo G com $m = n$ contém exatamente um ciclo.
 - (e) Um grafo é uma árvore se e só se não possui uma aresta-de-corte.
 - (f) Um grafo é uma floresta se e só se não possui uma aresta-de-corte.
 - (g) Uma floresta é um grafo bipartido.
 - (h) Um grafo G é uma árvore se e só se $m = n - 1$.
 - (i) Um grafo G é uma árvore se e só se não possui ciclos.
 - (j) Um grafo G é uma floresta se e só se $m = n - c(G)$.
 - (k) Um grafo G é uma floresta se e só se não possui ciclos.
 - (l) Um grafo G com $m < n$ possui um componente que é uma árvore.
 - (m) Todo grafo possui uma árvore geradora.
 - (n) Todo grafo possui uma floresta geradora.
 - (o) Se F é um subgrafo acíclico de um grafo conexo G , então existe uma árvore geradora em G que contém as arestas de F .
2. Prove que se T é uma árvore com $\Delta(T) \geq 2$ então T possui pelo menos $\Delta(T)$ folhas. Mostre que isto é o melhor possível exibindo um grafo com n vértices e Δ folhas para cada possível valor de n e Δ com $n > \Delta \geq 2$.
3. Prove que:

- (a) G é uma floresta se e só se todo subgrafo induzido possui vértice de grau menor ou igual a 1;
- (b) G é uma floresta se e só se todo subgrafo conexo é um subgrafo induzido.

Por que não posso dizer árvore em vez de floresta nas afirmações acima?

4. Seja T uma árvore tal que cada vértice possui grau 1 ou k . Quais são os possíveis valores de n ?
5. Prove que toda árvore não-trivial T possui pelo menos dois conjuntos independentes maximais, com igualdade somente se T for uma estrela.
6. Toda árvore é um grafo bipartido! Mostre que toda árvore possui uma folha na maior das classes da bipartição (em ambas se elas têm o mesmo tamanho).
7. (*) Um vértice v é dito *paizão* se é adjacente a pelo menos $g(v) - 1$ folhas. É verdade que toda árvore com $n \geq 2$ possui um vértice paizão?
8. (*) Prove que se T é uma árvore com k arestas e G é um grafo simples com $\delta(G) \geq k$, então G contém um subgrafo isomorfo a T . Sugestão: indução em k .
9. Suponha que T seja uma árvore na qual todo vértice adjacente a uma folha tem grau pelo menos 3. Prove que T possui duas folhas adjacentes a um mesmo vértice.
10. Suponha que T e T' sejam árvores geradoras de um grafo G . Para cada aresta $e \in E(T) - E(T')$, prove que existe uma aresta $e' \in E(T') - E(T)$ tal que $T' + e - e'$ e $T - e + e'$ são árvores geradoras de G .
11. Sejam g_1, \dots, g_n inteiros positivos com $n \geq 2$. Prove que existe uma árvore com vértices de graus g_1, \dots, g_n se e só se $\sum_{i=1}^n g_i = 2n - 2$.
12. (*) Seja G um grafo com $n \geq 3$ tal que $G - v$ é uma árvore para todo vértice v de G . Determine m em função de n e use isto para determinar G .
13. (**) Prove a propriedade de Helly para árvores: sejam T_1, \dots, T_k subárvores de uma árvore T tais que quaisquer duas dessas árvores possuem um vértice em comum. Prove que existe um vértice comum a todas essas subárvores.

Método 1: use indução em k : vai ser preciso fazer duas induções.

Método 2: use indução em $n = |V(T)|$: tome uma folha de T e verifique se para alguma das subárvores vale que $V(T_i) = \{v\}$. Se isso não valer, modifique T e as subárvores T_i convenientemente.

Mostre que a afirmação acima não é verdade se T não for uma árvore.

14. Seja G um grafo conexo contendo um único ciclo, digamos C . Determine o número de árvores geradoras de G .
15. Seja G um grafo conexo contendo exatamente dois ciclos C e C' . Determine o número de árvores geradoras de G . Sugestão: esses ciclos podem ter arestas em comum?
16. (*) Determine o número de árvores geradoras de $K_{2,n}$ para $n \geq 2$. Sugestão: chame de x e y os vértices da menor parte. Note que em qualquer árvore geradora exatamente um dos vértices da outra parte tem que ser vizinho de x e de y enquanto cada um dos outros vértices é vizinho de x ou de y (mas não de ambos). Conte o número de possibilidades.
17. (**) Seja e uma aresta qualquer de K_n onde $n \geq 3$. Prove que o número de árvores geradoras de $K_n - e$ é $(n-2) \cdot n^{n-3}$. Sugestão: note que por simetria, é irrelevante qual aresta de K_n é removida. Conte o número de pares (f, T) onde T é uma árvore geradora de K_n e $f \in E(T)$. Divida este resultado por ?? para obter o número de árvores geradoras de K_n que contém uma aresta fixa e . O resto deveria ser fácil.